




Esiti del trattamento riabilitativo di Villa Garda per i disturbi dell'alimentazione

Pazienti consecutivi dimessi negli anni
2015, 2016, 2017 e 2018

Numero pazienti con disturbo dell'alimentazione sottopeso (IMC < 18,5 kg/m²) ricoverati


Anno	< 18 aa	≥ 18 aa	Totale
2018	21	49	70
2017	22	54	76
2016	20	46	69
2015	23	44	64

Pazienti con disturbo dell'alimentazione sottopeso




Pazienti con disturbo dell'alimentazione sottopeso

Eating Disorder Examination Questionnaire (EDE-Q)




Pazienti con disturbo dell'alimentazione sottopeso

Brief Symptom Inventory (BSI)








Pazienti con disturbo dell'alimentazione sottopeso


Clinical Impairment Assessment (CIA)




Percentuale di pazienti che hanno interrotto e completato il trattamento



 Completers

 Drop-out

Percentuale di pazienti completers che raggiunge un BMI $\geq 18,5$ alla dimissione



Pazienti con disturbo dell'alimentazione sottopeso (tabelle riassuntiva anno 2018)

Maggiorenni (n=49)

Indicatore	Entrata	Dimissione	P
BMI	14,9 (2,5)	19,6 (1,2)	<0,001
Totale EDEQ	3,7 (1,4)	1,5 (1,1)	<0,001
BSI	2,0 (0,8)	0,8 (0,7)	<0,001
CIA	34,7 (10,9)	12,5 (11,5)	<0,001

84,4% BMI \geq 18,5 alla
dimissione
8,2% drop-out

Minorenni (n=21)

Indicatore	Entrata	Dimissione	P
Percentile di BMI	2,1 (5,4)	37,0 (17,7)	<0.001
Totale EDEQ	3,8 (1,6)	2,1 (1,2)	<0.001
BSI	2,0 (0,9)	1,3 (0,8)	<0.001
CIA	32,4 (13,1)	18,3 (10,4)	<0.001

100% percentile di
BMI \geq 18,5 alla
dimissione
14,3% drop-out

Percentuale di variazione degli indicatori pazienti non sottopeso


Indicatore	Anno 2018 (n=70)		Anno 2017 (n=76)		Anno 2016 (n=69)		Anno 2015 (n=64)	
	% var	D	% var	D	% var	d	% var	d
BMI	34,7	1,94	33,9	2,13	34,7	3,33	34,0	2,54
Totale EDEQ	55,4	1,65	56,6	1,91	55,6	1,83	47,5	1,67
BSI	55,1	1,46	56,1	1,55	22,6	1,22	25,9	1,42
CIA	70,0	1,75	57,4	1,57	56,7	2,00	52,6	1,96

Numero pazienti con disturbo dell'alimentazione non sottopeso (IMC $\geq 18,5$ kg/m²) ricoverati

Anno	< 18 aa	≥ 18 aa	Totale
2018	1	8	9
2017	2	9	11
2016	1	18	19
2015	7	16	23


Pazienti con disturbo dell'alimentazione non sottopeso

Body Mass Index




Pazienti con disturbo dell'alimentazione non sottopeso

Eating Disorder Examination Questionnaire (EDE-Q)




Pazienti con disturbo dell'alimentazione non sottopeso

Brief Symptom Inventory (BSI)




Pazienti con disturbo dell'alimentazione non sottopeso

Clinical Impairment Assessment (CIA)



Percentuale di pazienti che hanno interrotto il trattamento



Pazienti con disturbo dell'alimentazione sottopeso maggiorenni (tabelle riassuntiva anno 2018)

Maggiorenni (n=8)

	Entrata	Dimissione	P
BMI	22,4 (3,1)	23,6 (3,0)	0.116
Totale EDEQ	4,5 (1,3)	2,3 (1,4)	0,018
BSI	2,2 (0,4)	1,1 (0,6)	0,028
CIA	39,5 (6,3)	20,8 (14,3)	0,028

Minorenni (n=1)

	Entrata	Dimissione
Percentile di BMI	90,1	91,1
Totale EDEQ	3,1	0,4
BSI	1,2	0,1
CIA	10	1